

Extracod. del 1.^o Semest. de 1816.

17

N.º 501

Descripción de algunos Lichenes presentados à la

Sociedad Médica de Cádiz

Por D.ⁿ Pablo La-Parde, Miembro de
esta y otras corporaciones literarias &c.

1816.

Descripciones.

Lecidea Chroleuca; crusta membranacea, granulosa, albida: apotheciis prominentibus confertis junioribus praesertim concavis omnibus disco fusciscenti, flavo pinnatis, margine tumido flavissimo intus fuscis.

Habitat America supra cortices arborum immediate aut supra fungermanias arboribus adherentes, quarum reliquias amplectendo ac supervertendo crusta granulata ramulosa apparet.

Lecidea Pelutina. Tomento pallide viridi molliorimo ex fibris ramosis complicatis, tenuissimis ac minutissimis intertextis. Apotheciis tomento immersis planis minutis pallidis margine dilutiori.

Habitat America supra cortices arborum. Tomentum in sicco papiro communi paulo crassius est; humectatum colorem retinet, tuncque oculo armato fibrae ramosae ac erectae conspiciuntur. Apotheca habitusque diutius retant ne cornicularis confungatur; Nova Lecidearum sectio an genus novum?

Graphora Granulata, thallo monophyllo rigidiusculo ambitu ut plurimum

lucero, supra atro, subter lesi, nunc atro, nunc eneo = Apothecii sparsis immarginatis conseriusculis girophoricis.

Americana videt. Pag. super. nunc atra, nunc nigrescens, aliquando etiam ad centrum albo-maculata. i. Varietas Girophor. Slabra synopsis Acharii?

Girophora Grisea = thallo coriaceo-lobato supra lesi olivaceo-fusco albo-palido-maculato, subter albidio, fibrillis albidio-griseis praedito = Apothecii versus marginem insertis minutis planiusculis plicis ut plurimum circulariter concentricis.

Americanam esse suspicio. In specimine meo talles lobato-digitatus.

Girophora Lincta. thallo rigidiusculo sublobato, supra griseo-eneo, punctis adumbrato-nigris, subter eneo nigrescentique variegato, hinc ambitu quo praesertim nec raro pagina superiori fibrillis atris instructo = Apothecii sparsis planiusculis marginatis circinato flemosis.

Americana species, conferenda cum giroph. fimb. var. cylindrica synopsis Acharii.

Lecanora cyclomela = Crusta determinata tenuis granulosa albo-cinerea

5
Ambitu crenulato lineaque atra serpentina circumscripta.

Apothecii sensibus planis minutissimis, disco etiam in humido atro margine thallo concolori in junioribus tumido.

Supra porphidum ad Alpes Hispanicae Granatenses inter Lecideae pararem: gregatim habitat individuis crustam efformantibus continuam, linea tantum nigra circumscriptis separatis. Infusctata rufescit eodem colore aquam tinctam reddit, iterumque post annum aqua puteoli immersa ruberrima post exsiccationem apparuit. Specimen habeo benivolentia Cl. Clementa debitum, qui eam ad Lecanoram atram retulit, sed ex dictis constat aut speciem omnino novam esse, aut eandem saltem varietatem insignem.

Carmelia Mexia = thallo cartilagineo seposito orbiculari, laciniis lacero subpinnatifidis planis, hinc inde thalli elevatione fornicato-fistulosis, supra albidio eburneo cillis marginato concoloribus, subter candido, venis reticulato-tenuissimis, subpulverulento. Apothecii supra fistulas incidentibus disco fusco albo pruinoso margine erecto, crenato, crenis albo-ciliatis.

Lichen prorsus singulare. Porro a Chrysophthalmo licet quod habitum affine Phycii potius consociandum es-

Humectatum colorem retinet, tuncque capitem efformat e pediculis fistulosis erectisque compositum, quae a thalli elevatione procedunt apotheciaque sustentant.

Josepho Mesia Orvigranatensi
Verum naturalium, Vegetantium praesertim notitia
praedito,

Ingenii magnitudine
Omni-gena atque exquisita eruditione
incredibili dicendi vi et copia
Spectatissimo.

Parmelia Cabrera. = thallo capitoso, laciniis furcatis apice, nunc simplicibus, nunc parce dichotomis teretibus, subcompressis, pannoso-fungosis, albis, supra crusta lineari tenui, teri fragili albo referenti tectis, intus filo centrali atro donatis = Apotheciis terminalibus, pedicellatis vix fuscis, extus papilloso-rugosis. America vivit.

Antonio Cabrera,
Gaditanae Ecclesiae oratori; viro, morum simplicitate,
commendatissimo.

Optimo de re Botanica merito
Lichenum ac fucorum praesertim
Observatori oculatissimo.

Crusta excepta quae facillime separatur nec totam in latum laciniam tegit, nihil nisi lacinae aut ramuli potius restant ex substantia pannoso-fungosa (cuius fibrae oculo inermi imperceptibiles sunt) omnino ficti, quae undequaque tenaciter adheret filo atro centrali immediate sub crusta collocato, ac per totam ramuli longitudinem excurrenti. Apothecium multum indeni ex quo constat intus parenchymate albisimo compositum. Thallus adeo singularis, novum genus iudicio meo constituere debet, aut novam saltem Parmeliarum sectionem secundum Apothecii structuram Borreri nonnulli finitimum.

Borreria Echinata. thallo capitoso cinerenti, subtus nigro tenero eminenter canaliculato laciniis linearibus accurate dichotomis apicibus attenuatis aut subulatis, margine dense echinato, fibris atris ramosis rigidis erectisque = Suteillis fuscis-rubris, pedicellatis, ad basim rugoso plicatis. America vivit. Humectata refert.

Borreria Luxurians. = thallo capitoso rigidiusculo cinereo-referenti sub-

tus nigro-opaco, venoso, laciniis ad apotheciorum insertionem inflexis ampliatique de cetero angustis sublinearibus flexuosis sub-dichotomo-ramosis apice nunc simplicibus attenuatisque, nunc multifido crenatis = Apothecis disco castaneo margine tenui, adultioribus amplissimi dilaceratis omnibus pedicellatis, ceteris rugoso-reticulatis. = America vixit.

Borrera mollis = thallo albo rufo-rufo cepitose subtus nigro violaceo, nitido rugoso, canaliculato laciniis linearibus flexuosis ad apicem usque dichotomis hinc attenuatis = Apothecis pedicellatis inflexis laciniis medio insertis, disco fusco rubro margine tenui, ceteris rugosis = Mollitia colore nec laciniarum extremitate multifida à precedenti satis differt.

In specimine meo (quod humectatum roseo papi-
rum tinxit) subtus ad marginem fibrillarum vestigia deprehenduntur. America vegetatur.

Borrera candida = thallo cepitose albo, subtus leviter canaliculato candido pulverulento laciniis linearibus dichotomis margine albo ciliatis apice obtusis aut obsolete bifidis = Apothecis sessilibus planis disco carneo-pruinoso, margine

vantur. Laciniarum extremitate aliarum apex fuscus adparet, thallusque madefactus virent. America crescit.

Borrera capillata = thallo cepitose, laciniis rigidis angustissimis, linearibus dichotomis, ciliis atris, longis, ramisque marginatis, supra glabro, subtus leviter canaliculato, pulverulento apothecis urceolatis, disco planis sessilibus, disco fusco, margine profunde dentato; hinc ceterisque ciliis atris instructo = species minuta America habitat =.

Laciniis ab initio ut suspicor albae, post ad basin nigrescunt, sed utrinque de medio ad apicem constanter albae sunt, pulverisque sulphureo subtus compersae. thallus madefactus colorem sensat, disco vero carneo-pruinoso adparet.

Quinque has species quas in dissertatione habita ad Reg. Matritens. Medicinae Academi. descripsi (Borrera genere nondum invento) ad canaliculariam retuli.

Borrera Ramalioides = thallo crasso cartilagineo rigido supra pallido, glabro, subtus concolori insigniter canaliculato, ramis primariis musculo-reticulatis = Apothecis sessilibus planis disco carneo-pruinoso, margine

Thalli lanuginique colore, cyphellis rotundis, nec apotheciorum margine nigris radiato-albis, satis à Comata distincta: tomento lanuginoso lorum ambitum nonnihil excedente; totus lichen subfimbriatus apparet.

Sticta Palacea: thallo coriaceo suborbiculato imbriculis viridibus glauco, sinuato-lobato, lobis incis, subtus lanuginosis, fuscescenti = Apothecis marginalibus planiusculis rubris, margine nigrescenti, hinc utraque parte lanuginosis = Cyphellis pallidis rotundis ovalibusque subequalibus fusco-marginatis.

Habitat America. = Ex specimenibus meis mutilis thalli figura accurate determinare non licet. Tomentum apothecia ungens quasi galactaceum apparet.

Collema Carpostemma = thallo foliaceo viridibus, rugoso reticulato, lobis minutis girospicatis imbricatisque, in humida dilute viridibus subdiaphanis crispis ascendentibus composito = Apothecis junioribus rubris concavis margine pallido, adultioribus planis convexisque nigrescentibus, omnibus corona foliata complicata cunctis.

Vivit America = Thallus quem orbicularem superior

subtus dilaceratus apparet; hinc qua parte trunci adheret praesertim reticulatus est, nonnihilque pallens.

Collema Glandulosum = thallo foliaceo, tenui, viridibus, diaphano, imbriculis, lobis plicatis, rotundatis, versus peripheriam amplioribus, ambitu omnibus integrinuculis glanduloso-dentatis, in humido crispis ascendentibus revolutis in foreolas amplas depressas, subtus papularis = Apothecis nunc concavis, nunc planis papulis imbricatis disco fusco-rubro, margine tumido integro, pallido, dein nigrescenti.

America vivit. = Thallus tumescens eminentes diaphanis viridibus dilutione unctus apothecis concoloribus post eversionem intus prorsus utrumque apparet. Foreolis sive buris paginae superioris, subtus papulae sive ampullae respondent sicut apotheciorum excepto ubi foreola subtus papula supra induratur scutellam substantiam.

Collema Digitatum = thallo foliaceo sub-pellucido saturate viridi, subtus subconcolori utrumque subrugoso, tenuissime reticulato-venoso laciniis periferiis depressis latioribus rotundato-sinuatis centralibus scutelliferis digitato-elongatis,

his in humido tumentibus, turbinatis, fistuloso-inflatis =
Apothecis extremitate Digitorum ad centrum insertis
junioribus concavis omnino immixtis, adultioribus planis
sensilibus, dico etiam in siccis rubro margine integro
tenui pallido circumdato.

America vivit supra arborum truncos.

Usnea ochromella. Thallo pollicari capitulo, fasciculato ra-
mis teretibus erectis primoribus praesertim levibus, om-
nibus plus minusve diffracto-morili-formibus flavo
nigroque alternatim variegatis.

America vivit.

Sicut orbicula denotantur praeter alias notas filis centralis
elasticus adest usnearum character eminentiss.

Spherophoron Mocino. = Thallo teretibus fruticosis ~~etiam~~ ad basin
nigrescenti de caetero cinereo, intus flavo-lignato suberoso,
ramis subtriangulis pollicaribus papillis ~~ramis~~ ~~etiam~~ ~~etiam~~
Auris non raro super-indutis = Apothecis extremitata
ramorum fasciculatim confluentibus nunc cylindricis nunc
turbinatis clavatisque apertura submarginata, accurate

circulari nec lacera, cavitate conica muleo foeta nigro, tena-
citer inter se ac disco adherenti.

Josepho Mocino,

Novo Hispano, Matritensi Acad. quond. praefecto,

Grecis, latinisque instructo litteris,

Mexicanorum rebus linguaq. serrato, ligata solutaeq. orationis,

facilitate ac leporibus conspicuo,

Iui

Theologiae cuniculo summa cum laude confecto
Vr. medicae, Botanicae, Zoologiae studio

A natura paratus ipsoque deditus

Nov. Hispan. Guatimalam, Californiam ad novam usque diffi-
cultatibus, incommodis, periculis gravissimis ac innumerabilibus
supperatis, harum regionum vegetantia, animantiaque collegit
rite collocavit ac descripsit

Spri

Quod oblitus sui utque bono proderet communi Betica,
typho icterode miserrime versata, sponte sua aereque proprio,
regali munitus auctoritate, integre prestoque adfuerit.