

Extrait 2^e du 1^{er} semestre de 1888. n^o 48970.

10

4/12
1

Exposición Histórica

Del monstruo nacido el día 30. de Mayo
proximo anterior en la Calle de Topmanis
de esta Ciudad

Formada

Por una Comisión de la Sociedad Médica-Quir-
úrgica de Cadix, con arreglo a las observaciones
hechas durante su vida y al resultado de la
inspección del Cadáver

Presentada y leída

a la misma Sociedad en sesión extraordinaria
que celebró el día 8. del corriente.

Cádiz, Junio
de 1878.

Con el fin de proporcionar al público la mejor inteligencia y conocimiento del todo y partes de este monstruo, hemos creído útil y necesario presentarlo en las dos situaciones de frente y espaldas y dar una delineación de un esqueleto, tales como se advierten en las láminas 1.^a 2.^a y 3.^a Por aquella razón también se ha procurado que la descripción de este fenómeno se expusiera con un lenguaje claro y vulgar, dexando para ocasión mas oportuna el idioma propio de la ciencia.

Descripción del monstruo que nació en la Ciudad de Cadix el día 30. de Mayo de 1818.

Noticias relativas a los Padres de dicho monstruo.

Antonia Fernandez, natural de Cadix, de edad de 30. años, temperamento sanguineo y constitución sana, caso hace diez años con Domingo Dodero, natural de la Ribera de Fíral en Genova, de edad de 36. años, temperamento sanguineo, constitución gracil pero robusta, y ejercicio pescador. Ha tenido aquella en los diez años de su matrimonio quatro hijos, dos varones y dos hembras; y en los partos de todos ellos ha sido necesaria la extracción de las placentas o pares.

Durante los meses de la quinta preñez, ni ~~aparecieron~~ tubo sintomas extraordinarios, ni experimentó novedad alguna en su salud, de modo que puede decirse ~~que~~ fue bueno su embarazo.

A las 11. de la mañana del 30. de Mayo de 1818, empezaron los dolores del parto, el qual sin embargo no se verificó hasta las 10. del mismo día, en cuya hora se presentó ~~la cabeza~~ en buena situación la cabeza de 13: salió esta de la misma manera que el cuerpo con bastante facilidad; pero, al presentarse la parte inferior del vientre, se detubo algo aunque poco el parto, mientras se doblaron las 11. extremidades contra el vientre en dirección hacia la otra cabeza, y pasaron

4
por delante del ombligo para presentarse en las partes superiores: entonces fueron extrañados por D.^o José Ramiro, que estuvo ayudando a la Matrona D.^a Antonia Chaves; y continuando ^{se} después la expulsión del cuerpo y cabeza de A., salieron naturalmente sin mayor obstáculo. La placenta o par era muy voluminosa y constaba de un solo cordón umbilical, que estaba situado en el centro de ella; pero sin embargo fue arrojada entera y naturalmente a pocos momentos después de haber salido las criaturas.

Impresión externa.

Vivieron estas hasta ~~alrededor~~ las 4. y 13. minutos de la tarde del 4. del corriente, falleciendo con diferencia de 3. minutos la una después de la otra. En la vida de ambas observamos varias alternancias ⁽¹⁾ en la respiración y circulación, pues tanto ^{esta} como ~~esta~~ aquella fueron a veces iguales y a veces disiguales en la fuerza y en la frecuencia. Los quejidos de B. fueron lentos e intermitentes, pero A., ^{si bien} ~~siempre~~ por los gestos manifestaba señales de dolor ni pudo romper en llanto, ni se le oyó jamás el quejido. A ratos se aparecía un color amoratado por todo el rostro de B.; pero más frecuentemente se observaba en el otro, el que desde el momento de haber nacido manifestó un movimiento convulsivo en sus miembros, que hacia temer la pronta terminación de ^{su} vida. También se notaban en el mismo las palpitaciones naturales del corazón más fuertes q.^{ue} en A. Las evacuaciones

(1) Véase la nota letra (a)

2.^o
de vientre se verificaron varias veces por el solo y único ^{en fin} ~~conducto~~ que la naturaleza les había dado para tales funciones. Desde 20. horas antes de la muerte se contó el vientre de ambas, y se aumentaron los movimientos convulsivos de A., por lo qual murió el individuo que componían la comisión de la Sanidad Médico-Quirúrgica de esta Ciudad, encargada ya de la conservación y buena asistencia de aquella por disposición del Excmo. Sr. Capitán Genl. y Gobernador de esta Plaza, Sr. Don Mariano de la misma, les administró los medicamentos que el arte tiene acreditados para tales casos (1); mas apenas pudo el uno de ellos tragar algunas gotas del jarabe, pues desde la noche que precedió a su muerte tampoco habían podido mamar. Los movimientos voluntarios de ambas fueron siempre bastante lentos, pero mucho más en el que tenía las convulsiones.

Luego que fallecieron, recibió la expresada Comisión aviso de S.E. para que procediese a completar la impresión de un fenómeno tan extraordinario, y habiéndolo practicado con la detención que exigía la materia, resultaron las observaciones siguientes.

Los dos gemelos estaban unidos por la parte inferior del vientre, que era común a ellos y con un solo ombligo situado en el centro de aquel. El cordón que salió de dicho ombligo y toda su circunferencia estaban lividas y tenían el aspecto de una escara gangrenosa. A un lado del vientre se hallaban situadas las cadenas C. con los partes

(1) El jarabe de achicoria con mirbarbo y el de meconio fueron ordenados en pequeña cantidad.

6
sexuales femeninas, que no ofrecían otra irregularidad sino la de tener los grandes labios bastante separados y gruesos, y la de carecer de orificio o aberturas naturales. Las extremidades que correspondían a esta Cadena se hallaban bien conformadas. Igualmente lo estaban los nalgas de este mismo lado, y tenían la hendidura en un estado ordinario; mas el ano u extremidad inferior de los intestinos era mayor que lo común.

En la parte lateral opuesta D. había otra Cadena mas angosta que la antecedente, la cual ~~no ofrecía~~ sin ofrecer en su parte anterior ~~ninguna~~ traza alguna o señal de sexo, y en vez de ello se notaba acá en medio y debajo del pubis o empujón una errecuencia verrucosa de la línea de largo y 2. de ancho que se adhería solo al cutis. Las dos extremidades que pertenecían a este lado, aunque se conocían por el tacto que constaban de los huesos correspondientes a 2. miembros, carecían no obstante de rotula o choqueruela, y no podía afirmarse tampoco la existencia de los perones o canchillos menores: los tarsos o talones eran deformes: estas dos extremidades se hallaban cubiertas con una sola piel, de tal manera que a la vista ofrecían el aspecto de un miembro inferior. Los pies estaban erimados hasta mas de la mitad de la planta, y desde un poco mas arriba de esta separación ~~salían~~ salían 5. dedos hacia cada lado, siendo de advertir que el pie propio del lado A. tenía el dedo grueso muy separado de los demas y los tres ultimos se encontraron unidos por medio de una membrana preternatural. Dicha Cadena no te

7
nia posteriormente señal alguna de nalgas, ni orificio de ninguna especie y en su lugar notamos un ligero hundimiento.

El pecho, los brazos y la cabeza de B. estaban bien organizados.

El pecho de A. era algo abultado, y cerca del epigastrio o boca del estomago aparecía un tumor confuso, que manifestaba al tacto la fluctuación de un liquido dentro del pecho, y al traves de este liquido un cuerpo vascuante, duro y que se escapaba escondiéndose acia el costado derecho.

Las extremidades superiores no tenían rancia notable.

En las partes laterales del cuello por debajo de los angulos de la mandibula o quijada, encontramos dos tumores desiguales de considerable extension, duros y amoratados.

La cabeza era un poco voluminosa, y desde luego sospechamos la existencia de un hydrocephalo interno o colocion de serosidad. Las orejas quedaban una situacion transversal, de modo que sus lobulos o pulpejos miraban en linea recta acia la nariz. El occipucio o parte posterior de la cabeza era aplanado; la eminencia huesosa llamada protuberancia occipital externa que se situa en medio del colodillo, se obtenia tan borrada que parecia no existir; y a lo largo de ella habia una hendidura, q. aunque aparentaba la fractura de un hueso, solo estaba en el cutis.

Las partes posteriores de este cuerpo.

representaba la figura de dos espaldas unidas ⁴¹
por medio de un ^o solo lomo ^o común a ambos
individuos. Las espaldas de las vertebras ^o huesos
del espinazo se distinguían bien en una y otra
espalda, pero en la parte media no se percibieron.

La longitud total desde la más alta de
una cabeza a la más alta de otra era de 21. pul-
gadas. ⁴²

El mayor diámetro transversal desde las pun-
tas de los dedos ^o de los pies unidos hasta las de los separados
18. pulgadas.

La longitud de los brazos desde las extremidades
de los dedos de una a otra mano 16. pulgadas.

La longitud parcial de los ~~ext~~ miembros in-
feriores unidos 6. pulgadas y 3. líneas.

La misma longitud de los separados 7.
pulgadas y 6. líneas.

La circunferencia del abdomen ^o vientre
en ambos de 13. pulgadas.

La de la cabeza en B. 13. pulgadas y 6. líneas
en A. 13. pulgadas.

El cuerpo de uno y otro estaba algo ~~mas~~
~~todo~~ demagrado, y el color amarillado era mas
oscuro en la espalda: los miembros estaban flexi-
bles segun el movimiento que gozaban en vida,
pues las extremidades inferiores separadas podían
executar todos los regulares; pero las que es-
taban unidas tenían ~~o~~ únicamente movi-
mientos limitados en la ingle para poder
doblar y estender.

Las fontanelas ^o molleteras de l.

estaban ~~com~~ en estado natural, y las de A.
se hallaron mas osificadas.

Impreccion interna.

Hicieron una incision semicircular en el vientre y puestas
las entrañas a descubierto, encontraron en la parte media por
debajo del ombligo una especie de membrana, que separaba
interiormente el vientre del uno del del otro: este diafragma
^o tabique membranoso era compuesto del peritonio ^o tela in-
terior del vientre de cada uno, que unidos entre si no permi-
tían la comunicacion de unas entrañas con otras. Habia enton-
ces dos membranas partes comunes a los dos individuos, de
las quales es forzoso hablar antes de entrar en el examen
de las cavidades particulares a cada uno de ellos.

El septo membranoso dicho tenía dos caras la-
terales, dos bordes, uno superior y otro inferior y dos extre-
midades. En la cara lateral que correspondia al ^o individuo ^o cuerpo B. en-
contramos un cuerpo de la figura y consistencia del pene con
una cavidad en su interior semejante a la uretra, pero sin abier-
tura exterior y sin comunicacion con la vejiga de la orina.

En la cara lateral que pertenecia al cuerpo A.
hallamos una entrana semejante al utero ^o matriz con
dos cuerpos unidos ~~unidos~~ ^{en} en un partes laterales parecidos
a las trompas de Falopio (1), y en las extremidades de cada
habia dos entrañas que imitaban a los ovarios, siendo de notar
que todas las otras partes estaban mas voluminosas que la
que corresponde a las entrañas a quienes imitaban. El ute-
ro se comunicaba con el ano ^o extremidad del intestino rec-
to de A, y las trompas con el utero.

El borde superior del septo membranoso se ha-
llaba adhiriendo a la cara interna del vientre. El borde in-
ferior se estaba al cuerpo de las vertebras ^o huesos del es-
pinazo.

(1) Una de las partes internas de la generacion de la mujer.

De un extremo, la una estaba adherente al pubis i empuñe de las caderas C, y la otra se unia al pubis de las caderas D.

Desde el cuerpo de las vertebra hasta el empuñe de D. habia un ligamento, que, introduciendose en la pelvis de D, se abia a la cavidad interna de esta y reforzaba la adherencia del tabique o septo comun.

La verga de la orina ocupaba el espacio que dexaban entre si las dos hojas del diafragma dicho, apor mandose a las caderas de C.

Cavidades particulares de B.

El cerebro, cerebello y medula oblongada los observamos en un estado natural (1)

El corazon y los pulmones lo estaban igualmente.

El estomago era pequeño, y poco mayor que un intestino grueso. Los intestinos tenian su magnitud y situacion regular. El Hgado, bazo, pancreas y riñon derecho tenian buena organizacion, pero el riñon izquierdo estaba unanamente consumido, y carecia de ureter (2). El ureter derecho iba a desahogar en la parte lateral de la verga de la orina. La extremidad del intestino recto terminaba en el ano comun.

Cavidades particulares de A.

Entre los huesos de la cabeza y las membranas del cerebro habia una corta porcion de resonancia. La sustancia cortical o mas exterior de la masa cerebral era de color rojo uniforme: la sustancia medular de color mas rubio. Los ventriculos y demas partes del cerebro, cerebello y medula oblongada en un estado ordinario. En las fosas occipitales posteriores se encontro como media onza de sangre coagulada.

Abierto el pecho por donde aparecia

(1) En partes de la masa del cerebro

(2) Conducto por donde pasa la orina desde el riñon a la verga

El tumor referido en la inspeccion externa, se derramó como una libra de un liquido sanguinolento. No encontramos: (1) traguearteria (2) pulmones (3) pericardio (4). Toda la pleura (1) de ambos lados formaba una sola cavidad llena del liquido mencionado, y en medio del qual nadaba el corazon, que era bastante voluminoso, y estaba situado en la parte lateral derecha del feto. La cara externa de este organo se observó salpicada de manchas rojas, y en su parte posterior notamos dos tumores (1) del tamaño de dos quivantes.

El vientre estaba algo elevado y lo vimos lleno de un humor sero-purulento, inodoro, de color amarillo, cuya cantidad llegaba a media libra. El Hgado consistia de gran lobulo y el pequeño tenia una figura codiforme con un apendice en un base, que descendia sobre la pequeña corvadura del estomago, y la vesicula de la biled se halla en la parte superior del pequeño lobulo. El estomago era de tamaño regular y estaba lleno de gases: los demas intestinos conservaban su estado ordinario hasta llegar al Colon, cuyo ano faltaba, y la S se halló situada en la region iliaca derecha con las corvaduras unidas entre si, terminando su extremidad en el recto: este intestino ultimo desahogaba por el ano comun. El riñon izquierdo no era mas grande que lo natural, y su ureter pasando donde está enerrado por detras de la tuba Falopiana del mismo lado finalizaba en el recto. El riñon derecho tenia un volumen regular y un ureter, que rodeaba por detras de la tuba del mismo lado, iba a terminar a la cavidad llamada utero.

La pelvis o cadera C tenia buena conformacion:

- (1) Septo o tabique membranoso que divide al ^{pucho} en dos cavidades.
- (2) Conducto cartilago-membranoso que viene a la entrada y salida de aire en los pulmones.
- (3) Estas son undada las partes mas interesantes y raras del feto, nombradas describiendo y las que deben llamar mucho la atencion de todo observador de la naturaleza, pues siendo un principio recibido en Fisiología que ninguno puede

de vivir sin respirar ni respirar sin pulmones, dudamos como se habia engastado en el upor del pequeño lobulo. El estomago era de tamaño regular y estaba lleno de gases: los demas intestinos conservaban su estado ordinario hasta llegar al Colon, cuyo ano faltaba, y la S se halló situada en la region iliaca derecha con las corvaduras unidas entre si, terminando su extremidad en el recto: este intestino ultimo desahogaba por el ano comun. El riñon izquierdo no era mas grande que lo natural, y su ureter pasando donde está enerrado por detras de la tuba Falopiana del mismo lado finalizaba en el recto. El riñon derecho tenia un volumen regular y un ureter, que rodeaba por detras de la tuba del mismo lado, iba a terminar a la cavidad llamada utero.

la cara superior del sacro se articulaba con la parte lateral del cuerpo de las vertebrae: la misma articulacion tenian las espinas posteriores superiores de los ileos.

La pelvis era mas pequena, carecia de sacro, y se observaron en ella las mismas articulaciones.

La columna del espinal era continua en una y otra espalda, y las vertebrae intermedias a las caderas eran en numero de 5, las quales formaban un arco, cuya concavidad miraba hacia el vientre y la convexidad hacia los lomos.

No pudieron examinarse los musculos, arterias, venas y nervios; asi como ni los vasos linfaticos, los huesos y pulmones del cuello, porque el padre de los estos gemelos quiso conservarlos para un fin particular. Solo se pudo observar que el numero de costillas en cada uno era de 24.

Mientras produciere, guiados igualmente por el amor a la observacion que asegura los progresos de las ciencias naturales, nos han transmitido la descripcion de muchos fenomenos monstruosos; aunque por ellos se pueda tachar a algunos de credulos y algo superstitiosos. Ambrosio Paro, honor de la Ciudad de Francia, nos da el conocimiento de un monstruo, igual en sus formas exteriores al que acabamos de describir, que dio a luz en Chartres Cipriana Grande el ultimo dia de Febrero del año de 1572. y vivió hasta el domingo siguiente" V. Oeuvres de M^r. Ambro. Paro, à Paris 1575. fol. 90.

Cádiz 8. de Junio de 1818.

Ju. L. Bugarín
Vice-Presidente. Ju.

Juan Antonio Ameller

Rafael Luis Ameller

Juan Antonio Ameller

Leído en la Sesión extra-

Ordinario del 8 de Junio de 1818.

Rafael Luis Ameller
Presidente

Juan Antonio Ameller
Secretario

Leonardo Perez