

✠

Historia Anatomica del
reconocimiento e inspeccion de
un Fetus Monstruoso. ~. ~. ~.

D^a Juana de Aranda y Coronel natural de
la Ciudad de Granada, à la Parroquial de S.ⁿ Matias de edad
quarenta y un años, casada con D.ⁿ Miguel Montenegro tre
ce años de Matrimonio en cuyo tiempo havia tenido once partos
naturales de los quales en el penultimo parió dos niños, uno
de ellos monstruoso de Cabeza, cuya deformidad consistia en un
op en la frente, sin narizes, y por boca un agujero redondo, y el
ultimo que fué en trece de Marzo corriente de noventa y qua
tro, presentandose un fluxo copioso de aguas à que se siguió una
Criatura de Cabeza que parió sin tardanza, aunque con alguna
violencia, siendo un Fetus monstruoso, que representaba dos
hembras en accion de abrazarse, à poco rato se presentaron otros
nuevos dolores, y un fluxo sanguineo y en seguida otro fluxo aqueo
y la Cabeza de otra Criatura bien conformada y Varon. Las se
cundinas del primero fueron cortadas, y ligadas al muslo duran
te la segunda operacion llegando à salir las ultimas aun

siendo las del primero, su corporatura era una tercera parte mayor que la del segundo Fetus.

Examinado y reconocido à anatomica^{te} m.
este Fetus monstruoso, para la demostracion de su rareza mirado de pie, y por su parte anterior se notò en su.

Estructura esterna.

La figura extraordinaria de un cuerpo con una Cabeza, un Pecho, dos Vientres, y ocho extremidades quatro superiores, y quatro inferiores. La Cabeza era mirada como una sola Caja de Craneo, la parte anterior con sus mandibulas representaba una cara bien organizada, y de unas pulidas facciones, la posterior era formada por dos nuca, divididas por una endidura, en la que se notaron dos Tuberculos Carneos-cutaneos que aparecian como los pulpejos de otras dos Orejas, sus laterales eran ocupadas por las Orejas. El Cuello era corto, ancho, y grueso, figurando una sola garganta, y dos zervises.

El Pecho era formado por la union de medios esternones, dos ordenes de Costillas y dos Espinas opuestas, que representaba una sola cavidad compuesta de duplicadas partes continentes. En la union de esta cavidad con el vientre se separaron las partes, y formaban dos cavidades naturales en cuyo medio se hallava el cordon umbilical que mediava entre los dos empeines. Estas cavidades cons

taban de sus partes y regiones gozando de todas, y cada una de las partes propias à la generacion, y excrecion de uno y otro genero, haviendo oxinado y excretado por ellas.

Las extremidades superiores constaban de ombro, brazo y mano que pendian de las partes laterales superiores del Pecho. Las inferiores tomaban su principio en lo inferior, y lateral de las Caderas, y constaban de Muslo, Pierna, y Pie, que se miraban y tocaban por sus rodillas y dedos, cuyos talones eran opuestos y descansavan aun mismo tiempo en el suelo. Todas las quales partes se hallavan colocadas, y articuladas con el orden mas natural y conforme.

La Cutis era formada por una sola pieza que lo cubria en el todo, sin que se le notase doblez, pliegue, ni arruga, que hiciese significar union, pegadura, ò suelde de estas Criaturas, notando solo de especial en ella las desigualdades, ò emnencias de las supuestas Orejas. Todas las partes de este monstruo decian tanta relacion entre si que solo se podian entender de todas, lo que de cada una, à saber, que se confundian por la uniformidad de que se hallavan dotadas, sin embargo que eran bien distinguibles. En su

Estructura interna.

Se hallò que gozaba solo de un cordon umbilical que se introducía en el vientre parte media region de su nombre, y à poco de

su entrada se introducía en la parte concava de un Hígado de-
masiado voluminoso que se hallava ocupando la misma re-
gion. Esta entraña estaba dividida en dos partes iguales que
formaban dos lobulos. El cordon salia por una cortadura pos-
terior despues de haverse comunicado con los vasos de su substan-
cia. En este Hígado se notò de particular, que su vesiga de la hiel
se hallaba en una fosa parte superior combexa con sus duo-
tos para el duodeno, y un poco mas posterior el seno dicho de la
Porta, compuesto de troncos comunes, insinuandose en la mis-
ma substancia del Hígado, por otros tantos ramos que al paso
que se aumentavan en numero disminuian en calibre. Que
su vena hepatica descargava en el cordon à poco de su salida.
Que sus bordes estaban recortados en forma de anfractos he-
chos al parecer por los intestinos que se acomodaban en sus ar-
cos. Que su vesiga contenia una porcion de colera, y que sus
ligamentos, ò ataduras eran con el cordon, y centro del mesen-
terio. Y que el cordon caminaba hasta la Scisura de otro Hi-
gado menor, situado en el Hipocondrio derecho del fetus izqui-
erdo. La parte concava de este Hígado se hallaba recostada so-
bre el cuerpo del Estomago al piloro; su grande lobulo contenia
la Vexicula felea con su condueto comun, que descargava en
el duodeno; su parte combexa miraba al Diafragma donde
estaba por sus ligamentos. El cordon Umbilical se terminaba

en el seno de este Hígado, saliendo de esta Entraña un solo tronco he-
patico para la Cava.

Se notaron quatro Riñones con sus cavidades
y Vteros, que descendian à insinuarse en dos Vesigas de orina q.
terminaban por sus cuellos, y Vretras en el Orificio externo dicho
meatu. Cada vesiga tenia sus ligamentos al Vraco que se termi-
naban en sitio de la entrada del cordon en el Vientre.

Quatro Capsulas atraviliarias, tres iguales y una
mayor, que ocupava casi el sitio del vazo correspondiente al Fetus,
(que no se hallò) todas ellas estaban humedecidas por un licor à rez-
toso de negro, y se comunicaban inmediatamente con los Riñones.

Dos Vteros con sus correspondientes ovarios mortuos, tubas liga-
mentos, cuellos, y Vaginas que terminaban exteriormente en la bul-
va. Un Estomago, cuyo piloro se hallaba casi entre los dos Hígados, y
caminaba de arriba à baxo, y de adelante à tras al duodeno. En es-
te intestino se habrian los conduetos colidocos, uno superior, y otro in-
ferior, y los laterales de dos grandes pancreas. A este seguia el Ye-
quino, segundo Intestino que haciendo todas sus circumboluciones
se terminaba en el Uleon tercero de los delgado. Este intestino à
poco de su camino se dividia en dos canales iguales en dia metro al
primero, en medio de los quales se notò un apendix vermiforme de
dos dedos transbensos de longitud aunque cayo y ciego. Estos dos ra-

mos caminaban a la derecha, e izquierda para cada Fetus formando dos paquetes de Intestinos gruesos, que de el ciego colon, y recto, se terminaba en dos annos, por donde salieron, y en donde se contenian varias porciones de meconio. El Fetus derecho no tenia vazo, por tanto el seno del Hgado que le correspondia, era formado por las venas Mesentericas. Al contrario el Fetus izquierdo, pues tenia vazo cuyos vasos esplenicos entravan a la formacion del seno del Hgado pequeño.

En mesenterio comun muy prolongado, y acompañado de una grande, y numerosa distribucion de vasos de toda especie, particularmente sanguineos, este embolvia en si todos los intestinos guardando sus duplicaturas, y circumboluciones, y dando duplicadas, porciones meso-colon-meso-rectas, y otras que atavaban exactamente el Estomago por sus bordes con los Hgados y partes vecinas. En medio de este Mesenterio, y un poco superior se miraba su centro guarnecido de porciones glandulosas en forma de cuerpo, y que al parecer formaban el Pancreas de Aselia.

No se descubrió Omento, y si que el Peritoneo era bien grueso rodeado de mucha gordura, y bañado por una gran porcion de materia mucosa.

Primera demostracion.

Al Dicho. Se representava por un tronco comun, en

esta cavidad se encontró una robusta Pleura que formaba tres sacos en donde se contenian dos pulmones laterales y un Corazon medio, correspondiente al sternon posterior; estas Entrañas se hallavan humedecidas por un humor agüeo. Los Pulmones constaban de lobullos que pendian de sus bronquios y traquea. El Corazon constaba de ventriculos auricolas agujero oval y vasos mayores de los quales la Aorta a poco de su salida se anatómizava con otra mayor. La Pulmonar, y su vena entraban y salian en el Pulmon sin imbersion alguna. La Cava se unia con otra mas gruesa recogiendo hasta su union tres vasos, que segun su direccion eran de la Cabeza y extremidades superiores de un Fetus.

Separadas todas estas partes se descubrieron las Costillas de uno y otro lado hasta los cuerpos Vertebrales y se notó que la Pleura se hallaba atada de una Espina a otra en forma de Secto-medio, el qual separado, se observó estar pegado por superficies asperas a otra membrana, o porcion que al parecer era del mismo uso, pues se hallava atada del mismo modo, y a las mismas partes. En lo superior de estos tres sacos dichos de Pleura se hallava colocada una glandula Timo que correspondia entre las dos Claviculas cerrando la cavidad.

Primera parte.

Alvierta esta membana media se descubrió otra cavidad anterior en la que se notaron otros Pulmones laterales, y otro Corazon medio

y mayor encerrados del mismo modo en dilataciones de la Pleura.

Los Pulmones eran formados como los antecedentes hasta la Saringe. El Corazon estaba un poco aplanado y humedecido por su licor del pericardo constando como el anterior de todas sus partes siendo este el mas principal por su magnitud y porque sus vasos daban las distribuciones al todo.

La Aorta à poco de su salida se dividia en dos gruesos ramos à la derecha e izquierda al cuerpo de las vertebrae dorsales en donde formaban cada uno su arco, y de el salian, como del baculo, las Carotidas y suclavias de cada uno. Su tronco comun se continuava por el Pecho y Vientre hasta las Yliacas dividiendose con el mejor orden natural en todas las visceras de estas cavidades hallando solo de especial en la Aorta derecha, q. antes de formar el arco recibia la del pequeño Corazon. Que en el Vientre dava un tronco menos que la izquierda, à saber las Esplenicas por falta del vazo. La Cava era un gran tronco que recogia no solo sus ramos suclavios y Carotidos, sino estambien la Cava del pequeño. Separados todos estos organos, se descubrieron las Costillas, y Esternon contrario en cuya parte superior se halló otra glandula tymo, la qual cortada dava de sí una serocidad lactea en forma de rocía que separada las substituirian otras tantas gotas q. se vertian por los orificios de los vasos excretorios cortados. El cuello dava paso à dos traque-arterias, y un Esofago, las primeras ter-

minaban en sus Pulmones dichos, y el segundo en la boca superior del Estomago, todas ellas terminaban en la camara posterior de la boca una Saringe superior posterior, la otra anterior inferior, y el Esofago en medio. En la Boca solo se notó de especial que la Lengua era como una tercera parte mas larga la que para acomodarse en la boca, sitio natural, se doblaba hacia su ligam.^{to} anterior llenando toda la fosa, cuya figura conservó aun despues de separada, al mismo tiempo era dividida en dos partes laterales por una hendidura que de su apice caminava hasta el conducto ciego.

El Diafragma estaba figurado de forma que su superficie superior era como de uno, y la inferior se hallava dividida por una linea tendidasa que tomaba principio en el centro, y se terminava en dos ramos laterales sus ataduras por la parte posterior eran en pilares dobles à los Espinazos dava paso p. quatro agujeros para la vena Cava, Esofago, y Arterias Aortas. Su diametro transversal seria como de una tercera parte mayor que en estado regular dividiendo solo las cavidades y atandose tambien à las mucronatas. Segunda parte.

La Cabeza.

La cabeza presentó una gran masa Cerebral embuelta

en sus Meninges en la que se advertia una numerosa distri-
bucion de Arterias Sanguineas. El Cerebro mayor era solo
de un Fetus compuesto de sus dos Emisferios separadas entre
si, y con el pequeño Cerebro por las dilataciones de la dura
madre. El Cerebello era de dos sujetos pues constaba de qua-
tro lobulos contenidos y separados por otras tantas dobleces, y
divisiones, de cada dos lobulos salia un conducto en forma
de Calamus que se unian formando un comun para el
tercer Ventrículo. Una glandula Pineal, un Cuerpo Coroy
des numerosisimo, un Infundibulo, una glandula Pituita-
ria, y ambas muy corpulentas. El cuerpo de la Medula oblon-
gada, era compuesto de quatro pedunculos del Cerebello, y dos del
Cerebro terminandose en dos zancas, o cordones laterales q
entrando por dos agujeros occipitales componian la Me-
dula Espinal. El origen de nueve pares de Nervios distribu-
dos con el orden de un solo sujeto.

Si se toma este Monstruo por partes anatomica
se notará en ellas ademas de algunas rarezas que casi todas
eran dobles: si se mira como un solo sujeto, si como dos, que es
lo mas natural, que solo era defectuoso en algunas.

Osteologia

La Osteologia de dos sujetos fuera de los huesos de la Cara y

de siete del Cráneo, pues el Occipital era compuesto de dos apo-
fices basílares unidas, en cuyas partes laterales se hallaban
los orificios de sus agujeros que se habrían parte en el propio
hueso, su apofice crucialera acompañada de otras dos laterales
mas pequeñas. Sus Sternones se unían entre si, y con los seg-
mentos de las Costillas del contrario.

Sarcologia

La Sarcologia presentava en los nervios de raro la distribucion
del octavo par, que era como todos los del Cerebro de un solo sujeto
y su distribucion era de un cordón por cada lado à ramificarse
de forma que hacia lo que devían hacer dos, esto es, que un Fetus
goza de un par de cordones que se distribuyen en el todo de su cu-
erpo, y en este un solo cordón hacia la distribucion de un par.
Los nervios Spinales eran dobles. Las glandulas mas notar
eran dobles à excepcion de la Pituitaria y Pineal. Los Mus-
culos dobles fuera de los de la Cara Cráneo, y Orelas. Las visce-
ras dobles à excepcion de un Cerebro comun, un Esófago, Sto-
mago, e Intestinos. Primeros, delgados, y varo. Los vasos eran
dobles exceptuando la Vena Cava, y algunas divisiones mas
pequeñas como Splénicas, y algunos para el Cerebro &c. como
tambien una sola vena hepática.

Y es quanto se à observado en el Fetus hasta de farlo que

leto natural que conserva en su Estudio, el Liz.^{do} D.ⁿ Juan
Antonio Ruiz, profesor de Cirujia con Real aprouacion
Graduado Maestro en Artes del Gremio y Claustro de la
R.^e Imperial Universidad, Demostrador Publico de ana-
tomia de su Real Amphiteatro Anatomico, que hizo las di-
secciones de orden del S.^r D.ⁿ Ygnacio e Martinez de Villela Gov.
de la sala del Crimen, y en presencia de D.ⁿ Andres Gutierrez
de Dura, Cirujano de la asistencia de la Parturienta, y delat-
tor del caso, y de los Doctores D.ⁿ Josef Guillen, D.ⁿ Felix
Núñez, y D.ⁿ Juan de Medina Cathedraticos de Medicina
con otras muchas personas de autoridad e instruccion en los
estados secular, regular y Ecclesiastico. Y ultimam^{te} el vedel
Maestro D.ⁿ Miguel Faustino del Guiso el que testimo-
nio de orden del S.^r Rector.



