

Observac.ⁿ sobre los perjuic.^{os} q.^{os} ocasionó en una úlce-
ra atónica (S) el abuso de los Unguentos.

En un tpo. en q.^e los prácticos estan combencidos
y la experiencia diaria ensena constantem.^{te} q.^e la úlc. seca y los
fomentos son suficientes en gen.^l p.^o el tratam.^{to} de las heridas
y úlceras, brillando cada vez mas la justicia con q.^e han de
clamado los A.A. muy celebres contra el abuso rutinario q.^e se
ha echo de los Ung.^{tos} y balsamos en la curac.ⁿ de aquell.^{as}; po-
recera muy extraño y acaso inutil tomar la pluma p.^a persona
del de nuevo los incomb.^{tes} de una practica tan nociva; mas
como todavia se encuentran prácticos muy recomendables
p.^o otra pte, q.^e abusan de los topicos unguentac.^{os}, mas de lo q.^e
podia esperarse de suy conocim.^{to} no sera fuera de proposi-
to ^{acompañar} con una observac.ⁿ reciente los ~~comen~~ perjuic.^{os} de este
metodo y las ventajas obtenidas p.^o el opuesto. Esto es lo q.^e pre-
tendo hacer con la historia sig.^{te}

M. G. de edad de 25 años, sujeto robusto, de corta
estatura, y de temperam.^{to} limfiatico predominante, no ha-
bia padecido may enfermedad q.^e las prop.^{as} de la infancia, hta
el 26. de Ag.^{to} de 1819, q.^e habiendo pasado la noche anterior
tocando la Guitarra advirtió dolor y una excoriac.ⁿ cuta-
nea en el dedo indice de la mano derecha. Esta se curó al
cabo de alg.^{os} dias con un metodo sencillo y regular; may

(S) Asi llamo á la solucion de continuidad q.^e resultó de
la abertura espontanea del abceso axilal de q.^e voy á ou-
par me, p.^o estar sostenido de la debilidad local y gen.^l del si-
tema, q.^e es lo q.^e constituye la esencia de las úlceras atónicas.
Richetand, Nosografia Quirúrgica tom. 1.^o pag. 126. 4.^a edic.ⁿ

aqueel se extendió simpaticamente hasta la axila, y se fijó en los ganglios linfáticos q. la ocupan. Desde este momento calor, rubor, tensión, sed, calentura y todos los síntomas inflamatorios, gen. y local, tomaron tal incremento, q. el cirujano de su asistencia creyó indispensable la sangría, gen. y los subácidos, la dieta cataplasmas emolientes y todo el resto del plan antiphlogístico, con el cual se logró resolver la inflamación q. se había extendido a las glánd. cervicales, subclavas, subcapulares, y uq. inf. y a todo el tejido celular y cutáneo q. las cubre y rodea; mas no la q. atacó a las axilares: esta siguió la carrera de la supuración y verificado el absceso al cabo de veinte días, se abrió por sí mismo en el punto mas prominente, dexando salir una gran cantidad de pus correspondiente al tejido de donde procedia. Continuase p. entonces con los refrigerantes cataplasmas y ungu. emolientes, con uso de los de disminuir la supuración se aumentó en terminos q. al separar el brazo del tronco caía el pus hasta el suelo, y el enfermo empezó a experimentar vari. ataques de calentura q. en breve tomaron el caracter de una hética; apesar de esto no se q. se hiciese cosa alg. p. combatirla, p. la unica variación q. se hizo en el tratam. local fue substituir el ungu. de la Mere a el de Altea y cataplasmas emolientes, el qual produjo como era de esperar el aumento de la supuración, la mayor absorción de esta, y el incremento de la fiebre hética q. pasó a continua, y en consecuencia el enfriamiento aumentava, las fuerzas y el apetito disminuían, y el enfermo postrado en cama estaba constituido en un estado tal q. visitado accidentalmente p. un cirujano practico en primeros de Octubre le declaró p. incurable y próximo a la muerte sin alterar el plan curativo en cosa alguna. A este tpo. disminución muy considerable en la supuración de la úlcera saliendo esta muy tenue y serosa, y dolor punzitivo en el lado derecho hacia la mitad de la longitud de las costillas verd. respiración difícil, inspiración corta y frecuente, sofocación y opresión de pecho, tos, seca, pulso pequeño y concentrado con los demás síntomas de una pleuro-pneumonia: este estado duró hasta fines del día cuatro q. se moderó mucho desp. de una diarrea mucosa

abundante; y en el fue socorrido p. un Médico, q. le dió p. uso las bebidas mucilaginosas con el licor de Hoffman, y un vespicatorio sobre el costado pleurítico. Vari. circunstancias q. se sucedieron a este tpo. me obligaron a tomar a mi cargo la asistencia quirúrgica del enfermo; su estado a la sazón puede inferirse de las circunstancias antecedentes las cuales le habían constituido en una fístula mucosa q. se hallaba en su 2.º periodo, y la fiebre hética q. la acompañava rayaba ya en el 3.º p.º alg. síntomas. Mi primer cuidado fue desembarazar los bordes de dos pequeños forámenes q. había en la axila de una gran porción de ungu. pegado q. los rodeaba exhalando un olor tan rancio y nauseabundo como el toino de muchos años: un pus seroso mas o menos abundante salia p. aquellos comprimiendo las paredes del torax en vari. direcciones la úlcera y las compresas graduadas substituyeron a los unguentos; siendo el resultado de su aplicación la disminución progresiva de la supuración q. entonces suministrava la cantidad q. antes de la supresión la adhesión de las paredes de los senos p. la compresión y estímulo mecánico de la sonda flexible, y retardando la curación 3, 4, y 6. días. no obstante la cicatrización completa se hizo esperar hasta el restablecimiento de las fuerzas gen. las cuales no podían recobrase p. entonces, ya p. los progresos de la fiebre, ya p. los acúd. y q. siguieron a la terminación de la perineumonía, los cuales exponeré p. el orden de su desarrollo.

Dicha terminación no fue tan completa y feliz como se deseaba p. le quedo al enfermo una imposibilidad absoluta de echarse sobre el costado sano, experimentando q. lo hacia una tirantez y ansiedad insostenible, q. duraron todo el tpo. de la enfermedad y convalecencia; al mismo tpo. se hicieron sentir dolores y tensiones en ambas ingles, y una ophtalmia aguda grave atacó al ojo izquierdo. Esto paso en breve al grado de un verdadero chemosis aunque muy modificado p. el estado debilitado del paciente; el ojo aumento dos veces su volumen natural constituyendo la buphtalmia; una tumefacción tan considerable, los dolores lancinantes y el aumento de la calentura y demás síntomas febriles anunciaban la supuración del organo visual a pesar de los medios q. se em

4
pleaván p.^a evitarla. Verificado el triopion se abrió paso
el puy atraves de la membrana p.^a una pequeña abertura
oblicua de alto abajo q.^e se hizo á una línea de distancia
de la pte sup.^{or} de la pupila, sabiendo p.^a ella un puy sero me-
dado con porciones del cuerpo vitreo las cuales corrian á lo
largo la maxilla; la situac.ⁿ de la abert.^a su pequeña y
discre.ⁿ junto con la extraord.^a tumefac.ⁿ edematosa de los
párpados q.^e servían de vendaje compresivo fueron las
causas q.^e se opusieron á q.^e el globo se vaciase enteram.^{te} dos
veces cesó este flujo paulatino en el espacio de quince dias, y
otras tantas se repitió la ophtalmia con poca menor violencia q.^e
al principio; may al fin cesó del todo la salida del humor vero
so puriforme, cicatrízase la soluc.ⁿ q.^e la daba paso; exami-
ne entonce el estado del globo y hallé el cristalino enteram.^{te}
opaco, la capsula de este adherida á la pupila y con ella un poco
desplazado hacia el ángulo menor, disminuido el volumen del
globo dos quintas ptes, y atacada la conjuntiva de una lig.^a op-
talmia cronica varicosa q.^e aun permanece en el dia. 12. De
enero de 1825.

Al paso q.^e se aliviaban los dolores en el ojo, se
iban haciendo sentis con may vivero en ambas ingles á lo las-
se de los vasos crurales; las embrocac.^{es} y fomentos emolientes
parecieron calmarlos en la ing.^a izquierda, p.^a may esto p.^a
do ser p.^a q.^e preponderaron en la derecha extendiendose de
de allí á todo el muslo. Desde entonce el calor, dolor, y pulsa-
cion fueron muy manifestos, y el tumor q.^e se elevaba en pun-
ta hacia la mitad de la longitud del vástro externo, daban
suficientem.^{te} á conocer q.^e un nuevo trabajo supurat.^o se esta-
blecia en este lugar ó á lo men.^{os} q.^e una nueva metástasis se
habia echo en este lugar; las cataplasmas emolientes aunque
disminuían el dolor y la tension eran insuficientes p.^a pro-
curar la salida del puy p.^a hallarse contenido á acumulado
bajo de la fascialata; una incision q.^e penetrase hta. el fo-
lo purulento se hacia indispensable p.^a evitar q.^e el puy in-
filtrandose en el tejido celular del muslo y pierna diese
lugar á supurac.ⁿ interminable y acaso mortale, p.^a un empe-
mo q.^e se hallaba á la sazón, con sudor y copiosos, diarrea conti-
nuativa, la alopecia, y otros sintomas del 3.^{er} estado de la fiebre
hectica. Verificada la abert.^a correspond.^{te} salieron como dos

libras de un puy laudable, y curada con la hila seca las com-
presas y el vendaje espiral desde la planta del pie, p.^a
remediar á la tumefac.ⁿ edematosa, i infiltracion de alg.^a
cantidad de puy q.^e se habia ya insinuado hacia la pierna, no
dio lugar al dia sig.^{te} may q.^e una muy corta porcion de puy;
desde entonce empezaron á unirse las paredes de los senos y
la incision á cicatrizarse, lo qual no pudo completarse hta.
seis semanas desp.^{is} p.^a la atonia de su borde y la gen.^a del sig.
ma. Verificada la curac.ⁿ no quedó lesion ninguna en los
movim.^{tos} progresivos.

Durante el curso de estas diferentes afe.^{es} se representa-
ron como sucede con frecuencia las escaras gangenosas sobre la
region del sacro, condilo interno del humero derecho, parte may
sobresaliente de la espina de la escapula del mismo lado; pero
su curac.ⁿ se logró p.^a los medios ordin.^{arios} hta. el punto de separar
las escaras y establecerse la supurac.ⁿ p.^a entonce se mantubie-
ron estacionas q.^e sin adelantar nada hacia la cicatriza.ⁿ en ra-
zon de q.^e la calentura, los sudores, la tos, (los sudores), la expectora-
cion y la expectora.ⁿ de un moco viscoso y transparente eran
cada dia may considerable, apesar del uso alternado de las leches,
tonicos, mucilaginosos y calmantes. A este tpo, arrojó ~~sempre~~
mo con los esfuerzos de la tos, p.^a dos veces y con el intervalo co-
mo de diez dias, una cantidad considerable de un moco pesado,
y muy glutinoso mezclado de gran cantidad de sangre fluida
y muy rubicunda, desp.^{is} de lo cual el paciente tubo apetito
el cual q.^e se aumentó á terminos de parecer sintomatico,
no obstante se le concedieron alg.^a alimentos solidos proporcio-
dos á su estado y al cabo de dos semanas pareció algun tanto
recobrado, libre de la diarrea, pero iⁿte con la tos muy frecuen-
te y molesta y poco alivió en la calentura; jusque entonce
q.^e la tint.^a de g.^a era ineficaz p.^a el mucho uso q.^e de ella se
habia echo, y q.^e era forzoso duplicarlas dosis, ó suspender su
administrac.ⁿ p.^a alg.^a dias p.^a reiterarla desp.^{is}; siguióse este ul-
timo parecer y vivió con satisf.ⁿ q.^e desde aquel mismo dia
se moderó la calentura cesando á pocos dias del todo; la cicatri-
za de la difteria ulcerada, se completó y el empermo entró
en la combalecencia. Esta no fué contrariada p.^a ningun acci-
dente; duró tres meses, y quatro toda la carrera de los males referidos.

2.^a. llenando el estomago de alimentos se hace un centro de fluxion al qual se dirigen de preferencia las fuerzas vitales; esto determina la supresion de la supurac.ⁿ en las heridas y ulceras, y simpaticam.^{te} la misma opresion de pecho y demas sintomas q.^e caracterizan la lesion del aparato respiratorio; asi lo ha observado Richersand (obra citada pag 45) y esta es quizá la may fuerte objec.ⁿ q.^e puede hacerse contra la proposicion q.^e estableco: Es verdad q.^e yo no puedo asegurar q.^e mi enfermo no cometiese ningun exceso en el regimen de vida, constandome q.^e los cometa en los enfermos en los hospitales donde reyna la mayor vigilancia sobre este punto, pero si q.^e la atonia de los bordes y senos de la ulcera y el establecim.^{to} de la calentura hectica precedio en mi enfermo como se ha dicho á la afec.ⁿ pulmonar. Ademay el Autor citado solo ha observado desorden y sintomatico de este organo en consecuencia de los ingesta copiosos, y el sugeto de mi observac.ⁿ padecio ademay la opthalmia y Hemor del muslo, cuyas afec.^{es} se observan muchas veces en la practica en enfermos á quienes se ha suprimido no notablen.^{te} disminuido la supurac.ⁿ de una ulcera artificial ó natural q.^e ha durado algun tpo; luego siendo esto cierto y q.^e la fiebre hectica es el producto de la absorcion del pus en las ^{arterias} internas ó externas (Dicc.ⁿ de Medicina y Cirugia tom 2.^o Dicc.ⁿ de Med.^a pag 436) y q.^e esta absorcion se verifica principalmente quando los bordes de las ulc.^{es} han caido en la atonia

g.^a. El uso de los tónicos parece contribuyó à prolongar la calentura; seria acaso p.^o q.^o obraban como excitantes en razón de la suma debilidad del paciente. Si esto fuese así, g.^a se hizo en este caso la ley fisiologica de q.^o el habito de los estímulos

8
muchos disminuye las sensac.^{es} O: seria tambien p.^{ra} g.^{ra} en to-
day o en alej.^{se} de las ^{de este genero} hecéticas, perjudicial el plan tonico, co-
mo lo es el estimulante en las fiebres nerviosas o malignas de
cun las observac.^{es} del D.^{to} Hurtado? Si esto es así desde luego se
presenta un nuevo campo de investigac.^{es} utiles, y g.^{ra} requiere un
(nuevo campo de) digo un talento tan observador y despreocu-
pado como el g.^{ro} adorna al D.^{to} citado.

4.^a Finalmente si á beneficio de la edad, del
plan tonico, dieta analeptica, o de alej.^{se} otra causa g.^{ra} acaso
ignoramos se ha salvado un hombre con perdida de un ojo
desp.^{is} de haber corrido los mayores riesgos en la conservac.^{ion}
de su vida; pondremos en el la vista p.^{ra} conservar la costum-
bre de abusar de los ungue.^{ntos} estimulantes, irritantes o emoli-
entes, aplicandolos á las heridas o ulcers indistintam.^{te} en cu-
alquiera estado o periodo g.^{ra} se hallen, apartando n^{ra} ima-
ginac.^{ion} de los inconvenientes y perjuic.^{ios} de tal costumbre.
no por cierto, los practicos juiciosos p.^{ra} lo menos, saben q.^{ue} al
quoy sus casos favorables no pueden autorizar p.^{ra} seguir un
metodo constantem.^{te} nocivo.

El sugeto de esta observac.^{ion} p.^{ra} en el dia
de la mejor salud; y esta practicando la diligencia neces.^{aria}
p.^{ra} contra el Malhumorismo.

Valt.^a 3. de Enero de 1824.

Ramon Gona.^{le}
Moral
